

DE LOGOPEDIST

De logopedist is een paramedicus. Logopedisten signaleren, onderzoeken, diagnosticeren en behandelen stoornissen op de volgende gebieden: stem, spraak, taal, gehoor, eten en drinken. Logopedie wordt door de ziektekostenverzekeraars vanuit de basisverzekering vergoed. Om de gevolgen van afwijkend monddrag te beperken, is het belangrijk dat er vroegtijdig behandeld wordt. De logopedische behandeling van afwijkend monddrag zal circa tien tot twintig behandelingen in beslag nemen.

Tijdens de therapie kunt u het volgende verwachten:

- een intakegesprek;
- onderzoek;
- het behandelen van het afwijkend monddrag;
- het thuis herhalen van de oefeningen die tijdens de behandeling geoefend worden;
- een controle afspraak.



WAAR ZIJN WE TE VINDEN?

HOOFDLOCATIE

Logopediepraktijk Lombardijen
Socratesstraat 333, 3076 BX Rotterdam
T 010 - 432 57 45

NEVENLOCATIES

De Catamaran (basisschool)
Catullusweg 298, 3076 KH Rotterdam
T 010 - 432 57 45

Mr. van Eijck (basisschool)
Ruimersdijk 100, 3079 HK Rotterdam
T 010 - 432 57 45

Centrum voor Jeugd en Gezin, IJsselmonde
Groene tuin 265, 3078 KG Rotterdam
T 010 - 432 57 45

Wereld op Zuid (basisschool)
Schere 39, 3085 DT Rotterdam
T 010 - 432 57 45

Kijk voor meer informatie op
www.logopedielombardijen.nl



Informatiefolder Logopedie

Afwijkend monddrag



Uw verwijzer heeft afwijkend monddrag geconstateerd of er zijn factoren aanwezig die afwijkend monddrag bevorderen. Wanneer er niet of te laat wordt ingegrepen bij afwijkend monddrag, kan dit leiden tot een afwijkende kaak-en/of gebitsstand. In samenwerking met de logopedist kan een beter resultaat worden verkregen na orthodontie. Daarom zult u waarschijnlijk het advies hebben gekregen om contact op te nemen met een logopedist. In deze folder wordt u geïnformeerd over verschillende vormen van afwijkend monddrag. Tevens worden de oorzaken en gevolgen hiervan beschreven. Daarnaast vindt u ook informatie over de logopedist.

1. DUIM, VINGER- EN/OF SPEENZUIGEN

Veel kinderen duimen of zuigen wel eens op hun vinger(s). Wanneer een kind dit op driejarige leeftijd nog steeds doet, is er sprake van afwijkend monddrag. Vanaf dat moment kan het duimen, zuigen of spenen een negatieve invloed hebben op de stand van de tanden en de vorm van de kaak. Daarnaast kan de kracht van spieren in en rond de mond afnemen. Door het zuiggedrag komt het regelmatig voor dat de spieren in en rond de mond verslappen, waardoor habitueel mondademen, open monddrag en afwijkend slikken kan ontstaan. Dit kan leiden tot een afwijkende vorm van het gebit dat incorrect articuleren tot gevolg heeft. Hierbij kunt u denken aan het praten met de tong tussen of tegen de tanden (bijvoorbeeld bij slissen).

2. OPEN MONDGEDRAG

Normaal gesproken is de mond gesloten, rust de tongpunt tegen het gehemelte achter de boventanden en wordt er door de neus geademd. Wanneer de mond gedurende de dag regelmatig open is in rust (bijvoorbeeld tijdens tv kijken), is er sprake van open monddrag. Vaak ligt de tong dan slap onderin de mond en drukt de tong tegen de tanden aan, waardoor de tanden naar voren worden geduwd. Daarnaast is er veelal sprake van slappe mondspieren en mondademen. Wanneer dit probleem niet behandeld wordt, is er kans op incorrect articuleren (bijvoorbeeld slissen), een afwijkende groei van de kaak, tanden en kiezen en is er een verhoogde kans op oorproblemen.

3. HABITUEEL MONDADEMEN

Habitueel betekent 'gewoonlijk'. Bij habitueel mondademen is de gewoonte ontstaan om door de mond te ademen terwijl de neus voldoende doorgankelijk is. Gevolgen van habitueel mondademen kunnen zijn: een terugkerende infectie in de keel of van de amandelen of zelfs een middenoorontsteking. Daarnaast heeft habitueel mondademen invloed op de groei van de kaak, tanden en kiezen.

4. AFWIJKENDE TONGLIGGING IN RUST

Hierbij is de positie van de tong afwijkend. De tong ligt niet achter de tanden tegen het gehemelte, maar op de mondbodem, tegen of tussen de tanden of te ver achterin de mond. Dit kan de stand van de tanden en kiezen en/of de vorm van de kaak negatief beïnvloeden.

5. FOUTIEVE LIPGEWOONTEN

Onder foutieve lipgewoonten wordt liplikken en lipzuigen verstaan. Deze afwijkingen komen veelal voor bij mensen die door de mond ademen. Doordat de lippen droog worden tijdens het mondademen wordt het veelal als 'prettig' ervaren om de lippen te bevochtigen met de tong. Lipzuigen is meestal een gevolg van liplikken.

6. AFWIJKEND KAUWEN

Onder afwijkend kauwen wordt het smakken, het tegelijkertijd aan twee kanten kauwen en het verkeerd afbijten van voedsel verstaan. Dit kan leiden tot een verstoord evenwicht van de spieren in en rond de mond.

7. NAGELBIJTEN

Tijdens het nagelbijten schuift de onderkaak naar voren en ontstaat er te veel spanning in de kaakgewrichten, waardoor pijnklachten en overbelasting van spieren in het mondgebied het gevolg kunnen zijn. Bovenstaande vormen van afwijkend monddrag kunnen leiden tot afwijkend slikken.

8. AFWIJKEND SLIKKEN

Er wordt gesproken van afwijkend slikken wanneer de tong tijdens het slikken tegen de tanden en/of kiezen aan duwt of wanneer de tong tussen de tanden en/of kiezen door komt. Per dag slikt men ongeveer 2000 keer. Wanneer de tong elke keer met een grote kracht tegen of tussen de tanden en/of kiezen komt, zal dit invloed hebben op de vorm van het gebit.

WAAROM HEEFT U DEZE FOLDER ONTVANGEN VAN UW MONDHYGIËNIST, TANDARTS OF ORTHODONTIST?